

## ESCABIOSIS

Otros nombres: "Sarna", "Picor del séptimo año".

Contaminación de piel producida por la hembra del ácaro, una especie de arañita pequeña.  
Aparición de las lesiones: 15 días después del contagio.

**Manifestaciones:** Son pequeñas erupciones con mucha picazón especialmente en la noche. Esta erupción se ve más en los pliegues, entre los dedos de manos, axila, genitales, mamas, flancos y pene y escroto en hombre.

Es una contaminación de grupos familiares o de parejas que conviven íntimamente.  
TODOS DEBEN CUMPLIR EL TRATAMIENTO.

• **Tratamiento médico sugerido:**

1.- Tratamiento vía oral: Ivermectina Dosis: 200 microgramos/Kg de peso No administrar en menores de 4 años

2.- Tratamiento vía tópica: Ivermectina al 1%:

Aplicar crema o loción en todo el cuerpo del cuello para abajo, incluyendo entre los dedos, axilas y región inguinal, dejando por 8 horas y bañándose al día siguiente. Aplicar por 3 noches consecutivas. Descansar por 5 noches y volver a aplicar de la misma manera por 3 noches más.

2.A.- Como alternativa:

Azufre al 7 ó 10%: Aplicar crema en todo el cuerpo del cuello para abajo, incluyendo entre los dedos, axilas y región inguinal, dejando por 8 horas y bañándose al día siguiente. Aplicar por 3 noches consecutivas. Descansar por 5 días y volver a aplicar de la misma manera por 3 noches más

2.B.- Otras Alternativas:

Lindano al 1%, Benzoato de Bencilo 10- 25%, Permetrina al 5%.

3.- Manejo de los síntomas con:

Antialérgicos para calmar la picazón.

Lociones hidratantes para suavizar la piel

TODOS en la familia o casa deben recibir la ivermectina colocada y oral ( Esta última no en menores de 4 años).

• **Medidas básicas para erradicar la enfermedad en la familia.**

Toda la ropa debe hervirse, colocarla al sol y planchar con plancha bien caliente en las costuras o colocarla en el ciclo caliente de la lavadora. Planchar los colchones. No re usar ropa durante el tratamiento.

**INDICACIONES ESCABIOSIS - CREMA AZUFRADA.**

1. Aplicar la crema azufrada desde el cuello hasta los pies por tres 3 noches seguidas, retirando la crema por las mañanas con jabón suave no utilizar jabón de panela y aplicar crema y humectante que le indique su dermatólogo.

2. Descansar 7 días y repetir tratamiento nuevamente por 3 días.

3. Lavar las toallas, sábanas, pijamas y ropa utilizada diariamente con agua caliente y secar con calor secadora o al sol.

4. Aplicar calor en las superficies de camas, almohadas, sofás, etc.; a través de planchado, secador de pelo o exposición al sol.

5. Seguir las instrucciones de su dermatólogo si le indica otro tratamiento.

6. Acudir a control médico.

**TRATAMIENTO VÍA TÓPICA:**  
IVERMECTINA AL 1% O AZUFRE 7-10%. APLICAR CREMA O LOCIÓN EN TODO EL CUERPO DEL CUELLO PARA ABAJO, INCLUYENDO ENTRE LOS DEDOS, AXILAS Y REGIÓN INGUINAL, DEJANDO POR 8 HORAS Y BANANDOSE AL DIA SIGUIENTE. APLICAR POR 3 NOCHES CONSECUTIVAS. DESCANSAR POR 5 DIAS Y VOLVER A APLICAR DE LA MISMA MANERA POR 3 NOCHES MAS.

**ATACANDO LOS SÍNTOMAS:**  
TOMAR ANTIALÉRGICO Y APLICAR LOCIONES HUMECTANTES EN TODA LA PIEL.

**SÍNTOMAS:**  
PICAZÓN Y LESIONES EN PIEL.

**TRATAMIENTO PARA TODA LA FAMILIA**

**USAR CALOR PARA LA ROPA Y SÁBANAS Y ALMOHADAS:**

- SOL
- SECADOR O PLANCHA
- NO REUSAR LA ROPA SIN LAVARLA

**Laboratorio *Rp./*  
*fórmulas***

[www.laboratoriorp.com](http://www.laboratoriorp.com)

**ESCABIOSIS** "SARNA" o "PICOR DEL SÉPTIMO AÑO"